

|                         |  |                                  |
|-------------------------|--|----------------------------------|
| Dokument til hjemmeside |  | <b>KVALITETSHÅNDBOG</b>          |
| 01.07.2019              |  | <b>Information om Oesophagus</b> |
| Udarbejdet af: AR       |  | Revideres 01.07.2021             |
| Godkendt af: PvR        |  | Side 1 af 2                      |

## 1. Information om røntgenundersøgelse af spiserør (oesophagus)

Røntgenundersøgelse af dit spiserør bruges til at se om der er forsnævringer af spiserøret eller andre forhold, der ikke er normale. Resultatet af undersøgelsen bruges af din læge til at stille en diagnose og planlægge behandling, hvis det er nødvendigt.

## 2. Gravide

Hvis du er gravid skal det overvejes med din læge, om det er nødvendigt med en røntgenundersøgelse af dit spiserør. Vi skal spørge alle kvinder i alderen 12 – 50 år, om der er mulighed for, at de er gravide, før vi må lave en røntgenundersøgelse. Hvis det er tilfældet, vil undersøgelsen ofte blive aflyst.

## 3. Selve undersøgelsen

Du skal møde fastende til undersøgelsen (se neden for om forberedelse). I løbet af undersøgelsen skal du drikke en kontrastvæske (bariumsulfat). Det er et helt ufarligt stof og det passerer igennem dit tarmsystem. Der bliver ikke optaget nogle stoffer fra kontrastvæsken i din krop. Ved undersøgelsen tages der en række røntgenbilleder, der viser hvordan kontrastvæsken passerer end gennem dit spiserør. Hvis du har en halskæde på, skal den tages af før undersøgelsen.

Bagefter gemmes røntgenoptagelserne, og vores speciallæge vurderer efterfølgende optagelserne og laver en beskrivelse af undersøgelsen.

Den beskrivelse er resultatet af undersøgelsen, og den sendes til den læge, der har henvist dig til undersøgelse. Det er din henvisende læge, der har behandlingsansvaret for dig. Du skal derfor tale med din henvisende læge om resultatet af undersøgelsen.

Røntgenoptagelserne gemmes efterfølgende i mindst 5 år på en særlig sikret server (PACS-system). Det er et lovkrav, at vi skal gemme røntgenoptagelserne. Beskrivelsen af undersøgelsen, som bliver sendt til den henvisende læge, skal vi gemme elektronisk i mindst 10 år. Det er også et lovkrav.

## 4. Forberedelse til undersøgelsen

De sidste 4 timer før undersøgelsen må du ikke spise, ikke drikke noget (heller ikke vand), ikke ryge og heller ikke tygge tyggegummi. Du må ikke spise og drikke for at sikre, at dit spiserør er helt tomt. Hvis du ryger, vil blodkarrene trække sig sammen, og det vil give et dårligere resultat af undersøgelsen.

|                         |  |                                  |
|-------------------------|--|----------------------------------|
| Dokument til hjemmeside |  | <b>KVALITETSHÅNDBOG</b>          |
| 01.07.2019              |  | <b>Information om Oesophagus</b> |
| Udarbejdet af: AR       |  | Revideres 01.07.2021             |
| Godkendt af: PvR        |  | Side 2 af 2                      |

## 5. Er røntgen farlig?

Ved enhver røntgenundersøgelse tilstræber man at bruge den mindst mulige stråledosis. Hvis du er gravid, bør du sammen med din læge vurdere, om undersøgelsen kan vente.

Ved nogle røntgenundersøgelser bruger vi afdækning af kønsorganer (testikler og æggestokke). Det er i de tilfælde, hvor det fremgår af lovgivningen, at der skal bruges afdækning (gonadebeskyttelse).

Se også pjece om Information om risikoen for Røntgenstråling. Pjecen kan findes på hjemmesiden under punktet undersøgelser. Pjecen ligger også i venteværelserne på klinikken.